

AKSUM

COMPOSIZIONE	CIMOXANIL puro g. 30 Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	POLVERE BAGNABILE
CLASSIFICAZIONE	IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CONFEZIONI	1 KG
	AKSUM è un fungicida antiperonosporico citotropico dotato di attività preventiva e curativa. Agisce per contatto sulle spore germinanti e per via citotropica-translaminare all'interno dei tessuti sul micelio nei primi stadi di sviluppo. Assorbito entro 6 ore dal trattamento, presenta un effetto residuo limitato entro 4-6 giorni dall'intervento.



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

FUNGICIDA

VITE

Contro Peronospora della vite (*Plasmopora viticola*) alla dose di 60-75 g/hl in interventi preventivi a partire dalle prime condizioni favorevoli all'infezione e sino a fine fioritura. Dalla fase di allegagione e sino a chiusura grappoli, intervenire in miscela con prodotti di copertura riducendo la dose a 40-60 g/hl.

**POMODORO,
MELONE, TABACCO,
CARCIOFO, CIPOLLA,
PISELLO, LATTUGA,
SPINACIO,
ZUCCHINO,
AGLIO, PORRO,
GIRASOLE, SOIA e
ROSA**

Contro Peronosporacee (*Phytophthora infestans*, *Phytophthora porri*, *Bremia lactucae*, *Peronospora farinosa*, *Peronospora pisi*, *Peronospora schleideni*, *Peronospora manshurica*, *Pseudoperonospora cubensis*, *Plasmopora helianthi*, *Peronospora tabacina*, *Peronospora sparsa*) alla dose di 60-75 g/hl in interventi preventivi dal manifestarsi delle prime condizioni favorevoli all'infezione. Ripetere gli interventi in funzione dell'andamento climatico. In caso di infezioni in atto, eseguire due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. E' possibile ridurre la dose d'impiego a 30-35 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela a fungicidi di contatto tenendo comunque presente che la quantità di AKSUM distribuita non deve essere mai inferiore a 400 grammi per ettaro di superficie.

COMPATIBILITÀ

AKSUM non é miscibile con prodotti a reazione alcalina (es. polisolfuri e poltiglia bordolese) ed olii minerali. Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici; qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**INTERVALLO DI
SICUREZZA**

Vite, Pomodoro, Melone, Tabacco, Cipolla, Pisello, Lattuga, Spinacio, Zucchini, Aglio, Porro: 10 giorni. Carciofo: 21 giorni. Soia, Girasole: 28 giorni