


ZEUS

COMPOSIZIONE	BITERTANOLO puro g. 45,5 (=500 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	SOSPENSIONE CONCENTRATA
CLASSIFICAZIONE	NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CONFEZIONI	500 ml
	ZEUS è un fungicida locosistemico attivo nei confronti di numerose crittogame. La locosistemicità permette allo ZEUS di penetrare rapidamente nei tessuti vegetali e di localizzarsi in profondità, sfuggendo all'azione dilavante della pioggia.



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

Home Page: <http://www.roccafrutta.it> • E-mail: rocca.frutta@roccafrutta.it

FUNGICIDA

• MELO, PERO

contro Titchiolatura (con azione collaterale contro il mal bianco del melo) intervenire ad intervalli di 7-8 giorni a partire dalla fase di apertura delle gemme fino alla fase di frutto-nocce e successivamente ad intervalli di 8-12 giorni, alla dose di 30-40 ml/hl. Utilizzare il dosaggio superiore in caso di andamento climatico particolarmente favorevole alla malattia. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, scegliere il fungicida tradizionale da aggiungere allo ZEUS tenendo presente l'andamento climatico e le varietà da difendere. Utilizzare 40-50 ml/hl per trattamenti curativi ed eradicanti effettuato 1 o 2 interventi ravvicinati.

• PESCO, SUSINO, ALBICOCCO

contro Monilia effettuare 2-3 trattamenti prima, durante e dopo la fioritura, riprendendoli alla comparsa dei primi sintomi della malattia ad intervalli di 6-8 giorni alla dose di 50-60 ml/hl. Impiegare la dose più elevata e gli intervalli più brevi nei periodi climatici più favorevoli allo sviluppo della malattia. Contro Oidio effettuare trattamenti preventivi con inizio nella fase di scamicatura dei frutti, alla cadenza di 7-10 giorni circa alla dose di 30 ml/hl; in caso sia necessario intervenire con infezione in atto, elevare la dose a 40 ml/hl.

• PESCO

contro Cancri rameali alla dose di 50 ml/hl effettuato 2-3 trattamenti in autunno (da settembre a novembre in concomitanza con la fase di caduta delle foglie) e nelle fasi comprese fra bottoni rosa e accrescimento fruttifici. Questi interventi sono efficaci anche nei riguardi della Bolla ed hanno azione collaterale nei confronti dei Cancri rameali da Cytopara.

• ZUCCHINO, CETRIOLO

contro Rugigni e Mal bianco 30 ml/hl come trattamento preventivo; 2-3 trattamenti ad intervalli di 7-8 giorni alla dose di 40-50 ml/hl dei quali il primo all'inizio dell'attacco come trattamento curativo.

• BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

contro Cercospora 0,6-1 l/ha in 6-8 hl di acqua, eseguendo 2-4 trattamenti, con inizio alla comparsa dei primi sintomi e distanziandoli ad intervalli non superiori a 3-4 settimane a seconda delle condizioni climatiche più o meno favorevoli allo sviluppo della malattia.

• PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE (in pieno campo ed in serra)

Contro Oidio e Ruggine della rosa e delle altre piante ornamentali e da fiore, 40-50 ml/hl; trattamenti curativi alla dose di 50-80 ml/hl.

• CARENZE

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per Zucchini e Cetriolo; 20 giorni per Barbabietola da zucchero; 21 giorni per Pomacee e Drupacee.

• COMPATIBILITÀ

ZEUS può essere miscelato con fungicidi e insetticidi a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.