

# VESUVIO

<b>COMPOSIZIONE</b>	FLUAZIFOP-P-BUTILE puro g. 13,3 (= 125 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
<b>FORMULAZIONE</b>	CONCENTRATO EMULSIONABILE
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
<b>CONFEZIONI</b>	1 - 5 LT
	<p>VESUVIO è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi, sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.</p>



**ROCCA FRUTTA s.r.l.**

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

[www.roccafrutta.it](http://www.roccafrutta.it) • [rocca.frutta@roccafrutta.it](mailto:rocca.frutta@roccafrutta.it)

**ERBICIDA**

<b>AGRUMI, DRUPACEE, POMACEE, NOCCIOLO, OLIVO, VITE</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha.
<b>ORTAGGI (CARCIOFO, SEDANO, FINOCCHIO, COCOMERO, MELONE, PEPERONE, MELANZANA, RAVANELLO, CIPOLLA)</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha.
<b>FAGIOLO, FAGIOLINO, PISELLO, FAVA</b>	Contro Sorghetta da rizoma 2-2,5 l/ha. Intervenire prima della fioritura.
<b>PATATA</b>	Contro Graminacee annuali e perenni 1,5-2 l/ha.
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,25-2 l/ha. Contro Sorghetta da rizoma 2-2,5 l/ha.
<b>OLEAGINOSE (GIRASOLE, SOIA, COLZA)</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha. Contro Sorghetta da rizoma 2-2,5 l/ha.
<b>FORAGGIERE, LEGUMINOSE (TRIFOGLIO)</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha. Contro Sorghetta da rizoma 2-2,5 l/ha.
<b>TABACCO</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha.
<b>FLOREALI IN PIENO CAMPO E IN SERRA (ROSA, GAROFANO, LILIACEE, BULBOSE, GERBERA, GERANIO, VIOLA, PETUNIE, CRISANTEMO, STRELIZIA)</b>	Contro Graminacee annuali e bienni 1,5-2 l/ha.
<b>FITOTOSSICITÀ</b>	Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
<b>CARENZE</b>	Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, carciofo, sedano, finocchio, cocomero, melone, peperone, melanzana, ravanella, cipolla 30 giorni; patata 50 giorni; barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco 60 giorni.
<b>COMPATIBILITÀ</b>	In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.