

PUDONG 20 EW

COMPOSIZIONE	MICLOBUTANIL puro g. 20 (= 200 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	CONCENTRATO EMULSIONABILE
CLASSIFICAZIONE	NOCIVO
CONFEZIONI	500 ml
	<p>PUDONG 20 EW è un fungicida endoterapico. Grazie alla sua azione penetrante protegge le piante dall'interno con azione curativa.</p>



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

FUNGICIDA

VITE	<p>Contro Oidio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uva da vino 15-20 ml/hl fino alla fioritura, dall'allegagione in poi 20 ml/hl. I trattamenti vanno effettuati ad intervalli massimi di 14 giorni. - uva da tavola 15-20 ml/hl fino alla fioritura, dall'allegagione in poi 20 ml/hl. Trattare ad intervalli da 8 a 14 giorni a seconda del periodo vegetativo e dell'intensità della malattia. <p>Contro Marciume nero impiegare 20 ml/hl con cadenza di 8-14 giorni.</p>
MELO, PERO	<p>Contro Ticchiolatura e Oidio 25-30 ml/hl avendo cura di iniziare i trattamenti alla comparsa delle orecchiette di topo e proseguirli ogni 7-14 giorni a seconda della fase vegetativa e dell'intensità della malattia. Si raccomanda la miscela con il MANCOZEB od altro fungicida di contatto ad azione anti Ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia del formulato nei confronti della Ticchiolatura del frutto.</p>
PESCO, ALBICOCCO	<p>Contro Oidio 30-35 ml/hl dalla scamicatura del frutto, ad intervalli di 10-14 giorni. Contro Monilia 35 ml/hl.</p>
MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, CETRIOLO	<p>Contro Oidio 30-35 ml/hl, ad intervalli di 8-10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.</p>
POMODORO, PEPERONE	<p>Contro Oidio impiegare 30-35 ml/hl ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forte pressione della malattia.</p>
FRAGOLA	<p>Contro Oidio, sia in post-trapianto che in produzione, impiegare 25 ml/hl ogni 10-14 giorni a partire dal primo apparire della malattia.</p>
ROSA	<p>Contro Oidio e Ticchiolatura 20-25 ml/hl.</p>
GAROFANO	<p>Contro Ruggine 20-25 ml/hl con intervalli raccomandati dagli organi ufficiali locali.</p>
CARENZE	<p>Sospendere i trattamenti 15 giorni prima della raccolta di Vite, Melo e Pero, 7 giorni prima della raccolta di Albicocco e Pesco, 3 giorni prima della raccolta di Melone, Cocomero, Zucchini, Cetriolo, Pomodoro, Peperone e Fragola.</p>
COMPATIBILITÀ	<p>Il prodotto non è compatibile con i prodotti fitosanitari a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.</p>