

# LEADER

<b>COMPOSIZIONE</b>	TEBUCONAZOLO puro g. 20 Coformulanti q.b. a g. 100
<b>FORMULAZIONE</b>	GRANULI IDRODISPERSIBILI
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	NOCIVO
<b>CONFEZIONI</b>	1 KG



LEADER è un fungicida sistemico per pomacee (melo, pero) drupacee (pesco, nettarino, albicocco, ciliegio, susino), vite e cereali (grano ed orzo).



**ROCCA FRUTTA s.r.l.**

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA  
44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028  
[www.roccafrutta.it](http://www.roccafrutta.it) • [rocca.frutta@roccafrutta.it](mailto:rocca.frutta@roccafrutta.it)

**FUNGICIDA**

## POMACEE (melo, pero)

Contro ticchiolatura (*Venturia inequalis*, *Venturia pirina*) 0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua) in miscela con fungicidi di copertura (es.: dodina, captano, propineb, mancozeb, diclofluanide). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni, oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.  
Contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*) 0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua)  
Contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*) 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua)

## DRUPACEE (albicocco, ciliegio, pesco, nettarino, susino)

Contro *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea* 1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua). 1-2 trattamenti in preraccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua)  
Contro malbianco (*Sphaerotheca pannosa*) 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua)  
Contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,06% (60 g in 100 litri di acqua)

## VITE

Contro oidio (*Uncinula necator*) intervenire alla dose di 0,05% (50 g in 100 litri di acqua) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).

## CEREALI (grano, orzo)

Intervenire alla dose di 1,25 kg/ha posizionando il trattamento come di seguito:  
Contro le "malattie del piede" (*Pseudocercospora herpotrichoides*, *Ophiobolus graminis*) in fase di accostimento-levata.  
Contro oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura.  
Contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura.  
Contro *Septoria* (*Septoria* spp.) in fase di inizio levata-spigatura.

## TAPPETI ERBOSI

Contro *Microdochium nivale*, *Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 2-2,5 kg/ha (in 600-800 litri d'acqua) intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.  
In caso d'impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.

## CARENZE

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per pesco, nettarino, ciliegio, albicocco e susino; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per grano e orzo sospendendo il trattamento a fine fioritura; 30 giorni per melo.

## COMPATIBILITÀ

LEADER può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.