

# DELTA 25 EC

<b>COMPOSIZIONE</b>	DELTAMETRINA pura 2,81% (= 25 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
<b>FORMULAZIONE</b>	CONCENTRATO EMULSIONABILE
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
<b>CONFEZIONI</b>	1 - 5 LT
	DELTA 25 EC è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.



**ROCCA FRUTTA s.r.l.**

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

[www.roccafrutta.it](http://www.roccafrutta.it) • [rocca.frutta@roccafrutta.it](mailto:rocca.frutta@roccafrutta.it)

**INSETTICIDA**

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO	ESPRESSE IN ml/hl DI ACQUA.
<b>FRUTTICOLTURA (MELO, PERO, PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO)</b>	Contro psilla ml 75; afide verde del melo, afide del pesco ( <i>Myzus spp.</i> , <i>Hyalopterus spp.</i> , <i>Brachycaudus persicae</i> ) ml 30-50; cocciniglia di S. José ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30; cidia e anarsia ml 50-70; capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50; microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
<b>VITICOLTURA</b>	Contro tignole ml 40-60; piralide, nottue, cicaline, afidi, sigarao ml 30-50.
<b>AGRUMICOLTURA</b>	Contro afidi ml 40-50; aleurodidi e saissetia ml 40-60; mosca degli agrumi ml 50.
<b>OLIVICOLTURA</b>	Contro saissetia ml 40-60; tignola ( <i>Prays oleae</i> ) e tripide ml 50; mosca delle olive ml 50 in trattamento preventivo.
<b>ORTICOLTURA (ASPARAGI, CARCIOFO, CAVOLI, LATTUGHE E SIMILI, RUCOLA, SPINACI, CIPOLLA, PORRO, CETRIOLI, MELANZANE, POMODORI, PEPERONI, PISELLI, FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVE, CAROTE, SEDANI, PATATE, FRAGOLE)</b>	Contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30; afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
<b>CEREALI</b>	- mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30; afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50. - frumento (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30; cimici ml 50. - frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>	
<b>COLZA</b>	Contro altiche e nottue ml 30; cleono e lisso ml 50.
<b>SOIA</b>	Contro altiche e meligete ml 30; afidi e punteruoli ml 50.
<b>TABACCO</b>	Contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30; afidi ml 50.
<b>COTONE</b>	Contro nottue, afidi, tripidi, pulce ( <i>Eptitrix</i> ) 0,3-0,5 l/ha.
<b>FUNGHI COLTIVATI</b>	Contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
<b>MEDICALI</b>	Contro ditteri e collemboli ml 30-50.
<b>FLORICOLTURA (IN CAMPO O IN SERRA)</b>	Contro cavallette 500 ml/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio.
<b>VIVAI E COLTURE ORNAMENTALI (IN CAMPO O IN SERRA)</b>	Contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50; tortricidi del garofano ( <i>Bega</i> e <i>Epicoristide</i> ) ml 50-100. Contro afidi, cimice del platano ( <i>Corythuca</i> ), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.
<b>PIOPPO</b>	- in vivaio: contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50; criptorinco ml 100. - in piantagione: contro criptorinco ml 100; saperda ml 200; crisomelidi defogliatori ( <i>crisomela</i> , <i>crisomelidi minori</i> e <i>stilpnotiace</i> ) ml 30-50.
<b>COMPATIBILITÀ</b>	DELTA 25 EC è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di DELTA 25 EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione.
<b>CARENZE</b>	Sospendere i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su colza; 15 giorni prima del raccolto su erba medica, soia e cotone; 7 giorni prima del raccolto su cipolla, porro, sedano e patata; 3 giorni prima del raccolto sulle altre colture.