

GENIALROC 75 WP

COMPOSIZIONE	CIROMAZINA pura g. 75 Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	POLVERE BAGNABILE
CLASSIFICAZIONE	IRRITANTE
CONFEZIONI	250 g
	GENIALROC 75 WP è un insetticida regolatore con effetto inibitorio sullo sviluppo delle larve dei ditteri e con azione prolungata. Applicato alle foglie penetra rapidamente nei tessuti fogliari ove agisce sulle larve minatrici. Somministrato al terreno viene assorbito dalle radici e agisce per via sistemica.



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

INSETTICIDA

**PATATA, SEDANO, COCOMERO,
MELONE, CETRIOLO, ZUCCHINO,
CARCIOFO, PEPERONE,
MELANZANA, POMODORO,
LATTUGA (solo in pieno campo),
TABACCO, GAROFANO,
CRISANTEMO, GERBERA,
GIPSOFILIA**

Contro *Liriomyza* sia in serra che in pieno campo. Il prodotto si impiega inoltre nelle fungaie per il controllo degli Sciaridi e dei Foridi che attaccano i funghi coltivati. Nella generalità dei casi, per i trattamenti fogliari, la dose d'impiego in serra è di 25-30 g in 100 litri d'acqua; in pieno campo di 30-40 g in 100 litri d'acqua (pari a 300-400 g/ha). I trattamenti si iniziano alla comparsa delle primissime mine. A seconda della necessità, si ripete il trattamento alla distanza di 7-14 giorni. Per applicazioni di GENIALROC 75 WP al terreno e alle fungaie, la dose è di 1 kg/ha (10 g per 100 m²). Tale applicazione, oltre che con le normali attrezzature di irrorazione, può avvenire anche mediante irrigatori a goccia o a manichetta.

CARENZE

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta della patata; 14 giorni per le altre colture.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con altri antiparassitari. Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.