

ITAIPÙ

COMPOSIZIONE	ETO FENPROX puro g. 30 (= 280 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	LIQUIDO EMULSIONABILE
CLASSIFICAZIONE	PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CONFEZIONI	250 - 500 ml
	ITAIPÙ è un insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

INSETTICIDA

AGRUMI (arancio, mandarino compreso dementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo)	Contro Cicaline e Mosca della frutta: 50 ml/hl.
MELO, PERO	Contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e Cydia molesta: 30-50 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl.
PESCO	Contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, Anarsia lineatella, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa e Miridi: 50 ml/hl.
CILIEGIO	Contro Afidi e Mosca delle ciliegie: 50 ml/hl.
ALBICOCCO	Contro Anarsia lineatella e Mosca della frutta: 50 ml/hl.
SUSINO	Contro Cydia funebrana, Afidi, Anarsia lineatella, Ricamatrici e Cicaline: 50 ml/hl.
NOCCIOLO, CASTAGNO	Contro Cimici e Balanino: 50 ml/hl.
ACTINIDIA	Contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl.
CACHI	Contro Mosca della frutta e Metcalfa: 50 ml/hl.
FICHI, MELOGRANO	Contro Metcalfa: 50 ml/hl.
VITE	Contro Tignole, Cicaline e Metcalfa: 50 ml/hl; Tripidi: 100 ml/hl.
FRAGOLA	Contro Afidi e Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA	Contro Afidi, Tignole, Cicaline: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
POMODORO	Contro Afidi ed Aleurodidi: 50 ml/hl.
PEPERONE	Contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
MELANZANA	Contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
LATTUGHE e altre insalate (lattuga, crescione, scarola, indivia, radicchio, rucola, dolcetta)	Contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl.
SPINACI e simili (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia)	Contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl.
ERBE FRESCHE (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana)	Contro Miridi e Nottue: 50 ml/hl.
CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavoli di bruxelles)	Contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl.
CIPOLLA, AGLIO	Contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
MELONE, COCOMERO, ZUCCA	Contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl; Aphis gossypii: 60 ml/hl; Tripidi: 60-100 ml/hl.
FAGIOLINO	Contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 50 ml/hl.
PATATA	Contro Afidi, Dorifora e Miridi: 30-50 ml/hl.
MAIS	Contro Nottue e Piralide: 50 ml/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Contro Alica e Mamestra: 40-50 ml/hl.
COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI	Contro Afidi: 20-30 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 40-50 ml/hl.
PIOPPO	(escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 100-130 ml/hl.
RISCHI DI NOCIVITÀ	Tossico per le api; altamente tossico per gli organismi acquatici; Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CARENZE	Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca; 7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, albicocco, susino, actinidia, cachi, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, peperone, lattuga, crescione, scarola, indivia, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, fagiolino, aglio, cavolo cappuccio, cavoli di bruxelles, patata; 14 giorni prima della raccolta per cipolla, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno; 28 giorni prima della raccolta per mais.