

# RAMESSE 45 WG

<b>COMPOSIZIONE</b>	CIMOXANIL puro g. 45 Coformulanti q.b. a g. 100
<b>FORMULAZIONE</b>	GRANULI IDRODISPERSIBILI
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	NOCIVO - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
<b>CONFEZIONI</b>	500 g

RAMESSE 45 WG è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la Peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.



**ROCCA FRUTTA s.r.l.**

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

[www.roccafrutta.it](http://www.roccafrutta.it) • [rocca.frutta@roccafrutta.it](mailto:rocca.frutta@roccafrutta.it)

**FUNGICIDA**

**VITE**

Impiegare 40-50 g di prodotto per hl d'acqua. Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguire fino alla fine della fioritura; dall'allegagione, e per il resto della stagione, impiegare il prodotto miscelando con prodotti di contatto quali rameici, ditiocarbammati e folpet ad una dose ridotta rispetto a quella comunemente impiegata. La dose minima del prodotto per ettaro non deve comunque essere inferiore a 250 g.

**POMODORO,  
TABACCO, CARCIOFO,  
CIPOLLA, MELONE,  
PISELLO, LATTUGA,  
SPINACIO, ZUCCHINO,  
AGLIO, PORRO,  
GIRASOLE, SOIA, ROSA**

Impiegare 40-50 g di prodotto per hl di acqua. Iniziare i trattamenti preventivi al verificarsi delle condizioni di infezioni favorevoli alla malattia proseguendo per il resto della stagione. Nel caso vi possano essere delle infezioni in atto effettuare due trattamenti ravvicinati alla dose più alta. È possibile ridurre la dose a 20-25 g/hl se si effettuano trattamenti in miscela con prodotti di contatto. La dose minima di prodotto per ettaro non deve essere comunque inferiore a 250 g.

**CARENZE**

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta per Vite, Lattuga, Spinacio, Pomodoro, Melone, Zucchini, Pisello, Cipolla, Aaglio, Porro, Tabacco; 21 giorni per Carciofo; 28 giorni per Girasole e Soia.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina come Soluzione Bordoese o Polisolfuri ed olii minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.