

CIPERTRIN EC

COMPOSIZIONE	CIPERMETRINA g. 8 (= 72 g/l) Emulsionanti g. 15 Solventi e acqua q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	CONCENTRATO EMULSIONABILE
CLASSIFICAZIONE	PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO
CONFEZIONI	250 ml
	CIPERTRIN EC è un formulato insetticida inodore e non infiammabile ad azione snidante e residuale per il controllo di una vasta gamma di insetti volanti e striscianti (mosche, zanzare, vespe, scarafaggi, formiche, ragni, pesciolini d'argento, grilli, pulci, ecc.). Per le sue proprietà CIPERTRIN EC è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti N.U., trasporti rifiuti), ambienti ed attrezzature rurali, industrie in genere.



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

CIPERTRIN EC viene impiegato alle dosi da 1 a 2% (da 1 a 2 lt ogni 100 litri d'acqua):

- per lievi infestazioni e come trattamento di mantenimento, diluire in ragione di 1 lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 litri d'acqua.
- per medie infestazioni diluire in ragione di 2 lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 litri d'acqua.
- per forti infestazioni diluire in ragione di 2 lt di CIPERTRIN EC per ogni 100 litri d'acqua.

In caso usare sempre la concentrazione maggiore per l'impiego contro gli insetti striscianti.

CIPERTRIN EC, una volta diluito in acqua, va irrorato sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni e di tutti quei punti che possono essere sorgenti di infestazioni o percorsi abituali degli insetti. L'insetticida resta attivo per diverse settimane e la durata dell'azione dipende dalle condizioni di impiego: dosaggio, esposizione alla luce, tipo di superficie trattata, ecc. L'applicazione può essere effettuata con ogni tipo di nebulizzatore, in ragione di 1 lt di soluzione per ogni 10 mq di superficie.

NORME PRECAUZIONALI

CIPERTRIN EC deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Nel caso di impiego in impianti dell'industria alimentare il prodotto non deve comunque venire a contatto, anche indiretto, con i prodotti alimentari. Il locale deve essere sufficientemente areato prima del rientro.