

# ANAGROW 84

<b>COMPOSIZIONE</b>	NAA puro g. 7,5 (= 84 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
<b>FORMULAZIONE</b>	FITOREGOLATORE LIQUIDO
<b>CLASSIFICAZIONE</b>	ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
<b>CONFEZIONI</b>	5 LT
	ANAGROW 84 è un fitoregolatore liquido: impedisce la caduta prematura delle mele, delle pere e delle pesche.



**ROCCA FRUTTA s.r.l.**

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

[www.roccafrutta.it](http://www.roccafrutta.it) • [rocca.frutta@roccafrutta.it](mailto:rocca.frutta@roccafrutta.it)

**VARI**

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

Il dosaggio delle concentrazioni va regolato in base alla temperatura della stagione, usando una concentrazione più debole per le qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più mite ed una concentrazione più forte per qualità che vengono irrorate in una stagione con temperatura più fredda.

Con temperature inferiori ai 10°C ANAGROW 84 non può agire. Le dosi sottoindicate si riferiscono ad una temperatura ambientale di circa 20°C. Per ogni aumento di 5°C occorre ridurre le dosi dello 0,01%.

**MELE**

Precocissime: irrorare 7 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,015%, cioè 15 ml per 100 litri di acqua.

Precoci: irrorare 10-18 giorni prima del raccolto alla dose da 0,025 a 0,030%, cioè 25-30 ml per 100 litri di acqua.

Normali: irrorare 10-20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,030 a 0,050%, cioè 30-50 ml per 100 litri di acqua.

Tardive: irrorare 12-20 giorni prima del raccolto alla dose da 0,050 a 0,075%, cioè 50-75 ml per 100 litri di acqua.

Per certe qualità come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, rispettando la carenza di 7 giorni. Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine della foglia, ma in modo da non farle gocciolare. Tra il momento dell'applicazione ed un eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno 5 ore perchè si mantenga l'efficacia del preparato.

**PERE**

Irrorare 10-14 giorni prima del raccolto alla dose dello 0,050%, cioè 50 ml per 100 litri di acqua.

Per certe qualità come quelle con buccia liscia, grassa, spessa, sarà opportuno ripetere l'irrorazione, nel caso che si verifichi ancora la caduta dei frutti, rispettando la carenza di 7 giorni. Irrorare con apparecchi ad imboccatura sottile, procurando di bagnare entrambe le pagine della foglia, ma in modo da non farle gocciolare. Tra il momento dell'applicazione ed un eventuale precipitazione atmosferica, devono intercorrere almeno 5 ore perchè si mantenga l'efficacia del preparato.

**PESCO**

Effettuare il primo trattamento circa 15-20 giorni e il secondo trattamento 7 giorni prima della raccolta alla dose di 45-70 ml per 100 litri di acqua.

**CARENZE**

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

**COMPATIBILITÀ**

Non miscelare con antiparassitari.