

ARDITO 10 EC

COMPOSIZIONE	PYRIPROXYFEN puro g 10,86 (= 100 g/l) Coformulanti q.b. a g. 100
FORMULAZIONE	CONCENTRATO EMULSIONABILE
CLASSIFICAZIONE	IRRITANTE - PERICOLOSO PER L'AMBIENTE
CONFEZIONI	1 LT
	ARDITO 10 EC è un insetticida specifico per il controllo di cocciniglie su pomacee, drupacee ed agrumi e di mosca bianca su agrumi e colture coltivate in serra (pomodori, melanzane, peperoni, cetrioli, cetriolini, zucchini).



ROCCA FRUTTA s.r.l.

SPECIALITÀ PER L'AGRICOLTURA

44100 GAIBANA - FERRARA - ITALY

Via Ravenna, 1114 - Tel. 0532/718186 - Fax 0532/719028

www.roccafrutta.it • rocca.frutta@roccafrutta.it

INSETTICIDA

AGRUMI

Contro le cocciniglie effettuare un' applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria* sp. trattare quando le prime larve sono visibili. Dosi di impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes* sp.), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), *Parlatoria* (*Parlatoria* sp.), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San José (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl. Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO)

Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosus* = *Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata. Dose di impiego: 35-40 ml/hl. Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha.

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO

Contro mosche bianche (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi. Dose di impiego: 50-75 ml/hl. Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

CARENZE

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, peperone, cetrioli, cetriolini, zucchini; 28 giorni per agrumi. Su pomacee e drupacee trattare prima della fioritura.